

Aut-simile Substitution Urologika

Bei jeder Substitution sollte die Dosierungsempfehlung auch mit der Fachinformation abgeglichen werden!

Spezialitätenname (Wirkstoff)	Spezialitätenname(n) im Formularium	
	Spasmex® 20mg (Trospium) ¹	Betmiga® Ret. 25mg, 50mg (Mirabegron) ²
Detrusitol® SR (Tolterodin)		
2mg	1-2x 20mg	25-50mg
4mg	2x 20mg	25-50mg
Emselex® Ret. (Darifenacin)		
7.5mg	1-2x 20mg	25-50mg
15mg	2x 20mg	25-50mg
Toviaz® Ret. (Fesoterodin)		
4mg	1-2x 20mg	25-50mg
8mg	2x 20mg	25-50mg
Vesicare® (Solifenacin)		
5mg	1-2x 20mg	25-50mg
10mg	2x 20mg	25-50mg

Bemerkungen:

- ¹CAVE: Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz (CL<30ml/min): 1x 20mg/d. Einnahme auf nüchternen Magen (=1h vor oder 2h nach dem Essen)
- ²CAVE: Vorsicht bei Patienten mit (unkontrollierter) Hypertonie (s. auch im Ameli unter Betmiga® → Roter Handbrief)! QT-Zeit-Verlängerung möglich → Vorsicht mit anderen Wirkstoffen, die die QT-Zeit verlängern können. Betmiga® gehört nicht zur Gruppe der anticholinergen Spasmolytika, es handelt sich um einen Beta3-Adrenorezeptor-Agonisten → Kombination mit anticholinergen Wirkstoffen möglich