

**SARS CoV-2 Antikörpertherapie - Durchführung und Überwachung****Durchführung und Überwachung vor, während und nach der Verabreichung**

- Verabreichung durch dipl. Pflegefachperson oder Studierende mit entsprechender Kompetenz
 - Instruktion der Patientin / des Patienten sich bei folgenden Anzeichen sofort zu melden:
 - Unwohlsein / Brechreiz
 - Fieber / Schüttelfrost
 - Hautrötung / Juckreiz
 - Schmerzen / Atemnot
 - Überwachung vor Therapiebeginn:
Blutdruck, Puls, Temperatur, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung
- **Therapie mittels Infusion** siehe unter **A** und **Therapie mittels vgl-Injektion** siehe unter **B**

A Durchführung Antikörpertherapie mittels Infusion

- gleichzeitig zur Antikörpertherapie dürfen über das gleiche Katheterlumen keine anderen Infusionen laufen
- Infusion gemäss Verordnung anhängen
 - mit 0.2µm Filterbesteck (wird, wenn benötigt, von Apotheke mit Infusion mitgeliefert)
 - Reihenfolge: Patientin/Patient - Filterbesteck - übliches Infusionsbesteck - Infusion
 - **mittels Infusomat über 30 Min**
- dauernde Präsenz während der ersten 15 Minuten der Verabreichung
- Überwachung während und nach Infusion:

15 Min nach Infusionsbeginn	} Blutdruck, Puls, Temperatur Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung Zeichen einer Anaphylaxie
30 Min nach Infusionsbeginn	
bei Infusionsende	
30 Min nach Infusionsende	
60 Min nach Infusionsende	

→ bei Verdacht auf Unverträglichkeit Infusion sofort stoppen und Arztdienst informieren
→ bei schwerer allergischen Reaktionen: Rea-Alarm, Epi-Pen (ist während und bis 60 Minuten nach Infusion vor dem Zimmer deponiert)
- nach Infusionsende Katheterlumen mit mind. 20 ml NaCl 0,9% spülen und leere Infusion inkl. Infusionsbesteck entsorgen

B Durchführung der Antikörpertherapie (Evusheld) mittels vgl-Injektion

- Verordnung im KIS: in der Regel sind 2 Packungen à 2 Ampullen notwendig = 4 Ampullen

Start	Vis	systemisch parenteral	Einh	VW	Zeitpunkt	Stopp
28.09	MHOLEN	Evusheld; Inj Lös 150 mg/150 mg; 2 x 1,5 ml ventrogluteal - siehe Merkblatt Antikörpertherapie SARS-CoV-2	Amp	i.m.	-	4 0 0

- Medikament gemäss Packungsbeilage aufziehen
 - Evusheld besteht aus zwei Wirkstoffen: separat aufziehen
 - 300mg pro Wirkstoff = je 2 Ampullen = je 1 Spritze → insgesamt 2 Spritzen à 3ml
 - Wirkstoffe dürfen nicht gemischt werden!
- Medikament vgl verabreichen
 - weil zwei separate Spritzen: je eine Injektion rechts und eine links verabreichen
- Überwachung nach Injektion:

30 Min nach Injektion	} Blutdruck, Puls, Temperatur Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung Zeichen einer Anaphylaxie
60 Min nach Injektion	

→ bei Verdacht auf Unverträglichkeit sofort Arztdienst informieren
→ bei schwerer allergischen Reaktionen: Rea-Alarm, Epi-Pen (ist bis 60 Minuten nach Injektion in Patientennähe deponiert)