

Wirkstoff	Tagesdosen (mg/d)						Mittlere WD [Std.]	Verteilung der Tagesdosen auf	äquianalg. Potenz Mô (oral) = 1
Buprenorphin sublingual bzw. Pflaster (Temgesic®, Transtec®)	★	★	★	★	★	★	6-8	3 Dosen alle 6-8 h Pflaster: alle 96 h	75
Dihydrocodein oral/rektal (Codicontin®)	60	120	240	480	900		12	2 Dosen alle 12 h	0.15
Fentanyl TTS (mg/24h) (Durogesic® TTS Matrix)		0.3=12µg/h	0.6 = 25µg/h	1.2 = 50µg/h	1.8 = 75µg/h	2.4 = 100µg/h	48-72	alle 72 h wechseln	100
Hydromorphon oral ret. (Palladon®Retard) (Jurnista® retard)		4	8	16	32	64	12	Palladon: 2 Dosen: alle 12 h Jurnista: 1 Dosis: alle 24 h	7.5
Hydromorphon oral (Palladon®)		4	8	16	32	64	4	6 Dosen alle 4 h	7.5
Methadon oral/rektal (t1/2: bis zu 56h) (Ketalgin®)		10	20	40	80		6-8	3 Dosen alle 6-8	dosisabh.
Morphin oral/rektal ret. (MST Cont.®)		30	60	120	240	500	12	2 Dosen alle 12 h	1
Morphin oral/rektal (Sevredol®)		30	60	120	240	500	4	6 Dosen alle 4 h	1
Morphin s.c./i.v./PCA		10	20	40	80	160	2-4	4-6 Dosen alle 4-6 h	3
Nalbuphin HCl (Nalbuphin®)	★	★	★	★	★	★	2-4	4-8 Dosen alle 3- 6 h	3
Oxycodon oral (Oxycontin®ret.) Tagin® ret.)		15	30	60	120	250	12	2 Dosen alle 12 Stunden	2
Oxycodon oral (Oxynorm®)								6 Dosen alle 4-6 h	
Tapentadol (Palexia®)				300	600			6 Dosen alle 4-6 h	0.4
Pethidin HCl		75	150	300			2-4	6 Dosen alle 4-6 h	0.4
Tramadol oral/rektal/i.v. (Tramal®)	100	150	300	600			2-4 (retard: 8)	4-6 Dosen retard: 2 Dosen	0.2

★ es gibt keine Äquivalenzdosen, da es sich um einen Agonisten-Antagonisten (Nubain®) resp. um einen partiellen Agonisten (Temgesic®) handelt

Lit.: Arzneimittelkompendium 2012